

عنوان : عوارض چشمی سارکوئیدوزیس

دکتر حسن بهبودی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه : چشم تحت تاثیر بسیاری از بیماریهای سیستمیک قرار می گیرد. یکی از بیماریهای مهم سیستمیک که چشم انسان را دچار آسیب می کند بیماری سارکوئیدوز می باشد.

بحث : بیماری سارکوئیدوز در هر سنی انسان را مبتلا می کند ولی بیشتر در سن ۲۰ تا ۵۰ سالگی دیده می شود. این بیماری عوارض مهمی بر روی ریه ها ، استخوانها ، چشم ، پوست و مغز دارد که عوارض چشمی آن در ۵۰-۲۵٪ از بیماران سارکوئیدوز دیده می شود. گرفتاری پلک ها ، اوربیت ، غدد اشکی ، ملتحمه و سگمان قدامی و خلفی در چشم دیده می شود. از علایم مهم این بیماری در چشم ، التهاب غدد اشکی ، ملتحمه و متعاقب آن خشکی چشم ، التهاب اتاق قدامی و ایجاد ندولهای آیریس ، چسبندگی خلفی آیریس به لنز ، کاتاراکت ، التهاب ویتره ، گرانولوم عصب بینایی ، واسکولیت وریدهای شبکیه و علامت مهم Candle wax – Dripping در اطراف وریدها ، خونریزی های سطح رتین ، ادم سیستوئید ماکولا از علایم مهم سارکوئیدوز در چشم است.

نتیجه گیری : علایم التهابی سارکوئیدوز در چشم می تواند به تشخیص بیماری در بیماران کمک کند و با داروهای ضد التهابی درمان شود. در صورت عدم تشخیص و درمان می تواند منجر به کاهش شدید بینایی بیماران شود.